

သွေးတိုးရောဂါ၏နောက်ဆက်တွဲရောဂါဆိုးကျိုးများ



လေဖြတ်ခြင်း



နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်း



မျက်စိကွယ်ခြင်း



ကျောက်ကပ်ပျက်ခြင်း

သွေးတိုးရောဂါဖြစ်လာလျှင်  
ဆေးဝါးများ ငုံ့မန့်မီဝဲပါ။

- နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါဆိုးကျိုးကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
- ကာကွယ်နိုင်သည့် သွေးကျဆေးများသည် လူနာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အာနိသင်နှင့်ဆိုးကျိုးများ မတူတတ်သဖြင့် တစ်ဦးချင်းသက်ဆိုင်ရာနှင့် တိုင်ပင်စမ်းသပ်ပြီးမှ ဆေးမှီဝဲပါ။
- ဆေးထိရောက်မှုကို သိရှိရန် သွေးပေါင်ချိန်ကို မှန်မှန်ချိန်ပါ။

# သွေးတိုးရောဂါ

- သွေးတိုးရောဂါဆိုသည်မှာ -

သွေးပေါင်ချိန် ၁၄၀/၉၀ နှင့်အထက်ရှိပါက သွေးတိုးရောဂါဟု သတ်မှတ်သည်။

သွေးတိုးရောဂါဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများ

- အငန်၊ အဆီ အစားများသူ
- ဆီးချိုရောဂါရှိသူ
- အဝလွန်သူ
- မိဘမျိုးရိုးသွေးတိုးရောဂါရှိသူ
- ဆေးလိပ်သောက်သူများ
- အရက်သောက်သူများ
- ကျောက်ကပ်ရောဂါနှင့်အခြားရောဂါများ
- အချို့မှီဝဲသောဆေးဝါးများ (ဥပမာ - ပဋိသန္ဓေတားဆေး)
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ

# သွေးတိုးရောဂါသိကောင်းစရာ

သင် သိသင့်သည်မှာ  
သွေးတိုးရောဂါ ရှိနေသည်ကို  
လူနာများ၏ ၄၅% က မသိကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် သွေးတိုးရောဂါရှိ / မရှိ သိရှိရန်  
သင့် သွေးပေါင်ချိန်ကို ယနေ့ချိန်ကြည့်ပါ။



နှလုံးသွေးကြောရောဂါထိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်

WHO-CVD PROJECT

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန  
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန



၂၀၂၂



ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော  
နေထိုင်စားသောက်မှု ခန့်သည့်  
ဆေးဝါးများ အလားတူ ထိရောက်နိုင်ပါသည်။


**သွေးတိုးရောဂါကာကွယ်ရန်**

- ◆ အမျှင်ဓါတ်နှင့်ပီတာမင်များပြီး လတ်ဆတ်သော သစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် နံစားသီးနှံ (ပြောင်း၊ လူး၊ ဆတ်) များများစားပါ။
- ◆ နို့နှင့်ဒိန်ချဉ်များကို အဆီဓာတ်ထုတ်၍ အသားများကို အဆီဖယ်၍ စားပါ။
- ◆ ဤပြည့်ဝအဆီများအစား သီးနှံမှရသော မပြည့်ဝဆီနှင့် အစားထိုးပါ။
- ◆ အချိုဓါတ်ကို ရှောင်ပါ။

**ဝေဠေးပေါင် မှန်မှန်ချိန်ပါ။**

**များများစားသင့်သောအစားအစာများ**

- ပဲအမျိုးမျိုး (ကုလားပဲ)
- အစေ့အဆန် (သီဟိုဠ်စေ့)
- အဆီပေါသောငါးကို တစ်ပါတ်လျှင် အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် စားသုံးပါ။



**အဝန်ဓာတ်သည် ဝေဠေးပေါင်ချိန်ကို  
မြင့်စေသဖြင့် အဝန်ဓာတ်ကို ရှောင်ပါ။**



- ◆ လတ်ဆတ်သော အစားအစာများကို အများဆုံးစားသုံးပါ။
- ◆ စည်သွတ်ဘူးများ မစားမီ ဖော်ပြထားသော အဝန်ဓာတ် အပါအဝင် ဓာတ်မျိုးစုံ၏ ပမာဏကို ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
- ◆ အသားငါး အခြောက်များ၊ သနပ်များနှင့် စားသုံးရန် အသင့် ပြုလုပ်ထားသော အထုပ်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- ◆ အဝန်ဓာတ်များပါသော ငါး/ပဲခဲပြာရည်တို့ကို လျော့စားပါ။
- ◆ ထမင်းစားလျှင် ဆားထပ်မထည့်ပါနှင့်။ ချက်ပြုတ်ရာတွင် အဝန်ဓာတ် လျော့ထည့်ပါ။
- ◆ ဆီကြော်မှုန့်များ၊ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်နှင့် အစေ့အဆန်တို့ကို ဆားမဖြူးဘဲ စားသုံးပါ။
- ◆ စားသောက်ဆိုင်များမှ အစားအစာများကို ခဏခဏ မစားသင့်ပါ။

**သေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။**



**အရက်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။**  
အရက်ကို တစ်နေ့လျှင် ၁-၂ ယူနစ်ထက် မပိုစေရ။ အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။



**ပုံမှန်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသည်  
ကျန်းမာရေးကို ထူးကဲစွာ အကျိုးပြုနိုင်သည်။**

- တစ်နေ့လျှင် မိနစ် ၃၀ မှ တစ်နာရီအထိ နေ့တိုင်း နီးပါး လမ်းလျှောက်ပါ။
- စက်ဘီးစီးပါ။ ရေကူးပါ။
- ကိုယ်အလေးချိန် ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပါ။

